




ALP-ATEŞ
GÜBRE A.Ş





HEDEF
HEM VERİM HEM YARIN

İSKENDERUN LİMANI



GÜNEYİN ANA ARTERİNDE
GÜÇLÜ BİR DOST



HATAY
ULUSLARARASI
HAVALİMANI

51 Km



ÇUKUROVA
ULUSLARARASI
HAVALİMANI

165 Km



Kalıcı Değerler üretiyoruz!

Değerli İş Ortaklarımız;



2003 yılında kalıcı değerler üretmek için çıktığımız bu yolda; Ülkemize ve siz değerli paydaşlarımıza yatırım yapmayı en büyük sermayemiz olarak gördük.

Sürdürülebilir tarımın insanlığın geleceği olduğu fikri benim ve birlikte çalıştığım arkadaşlarımın çalışma azmini ve potansiyelini oluşturdu. Bugünün kalite ve güveninin temelini dünden hazırladığımız gibi, yarına da eğitilmiş, sektörün kanallarından yetişen bir ekiple hazırız.

Gelecek planlarımızı çalışanlarımızla, paydaşlarımızla ve çiftçilerimizle birlikte yapıyoruz. Farkımızı ürün kalitemiz ve çeşitliliğimizle koruyor, hizmeti çiftçimizin ayağına kadar götürüyor, verimi garanti ediyor ve bereketin mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Bu dayanışma ruhuyla çok daha büyük hedefleri gözetiyor, elde ettiğimiz başarıları sağlam adımlarla daha da ileri taşıyoruz.

Biz olmanın, aynı hayalleri paylaşmanın gücüyle ...

Şükrü ALPAYDIN
Yönetim Kurulu Başkanı





ORGANİK
SIVI GÜBRELER



KİMYEVİ
SIVI GÜBRELER




KLASİK
GÜBRELER



DAMLA SULAMA
GÜBRELERİ



YAVAŞ SALINIMILI
GÜBRELER



AZOT İÇERİKLİ
GÜBRELER



ORGANOMİNERAL
GÜBRELERİ



MİKRO GRANÜL
GÜBRELER



Organik Sıvı gübreler


RUTER

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

RUTER

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Organik Madde	45
Organik Karbon	20
Toplam Azot (N)	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Ph Aralığı	3-5



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.




TALLUS

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU

TALLUS

ORGANİK KAYNAKLI ÜRÜNLER
SIVI DENİZ YOSUNU

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	12
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
Alginik Asit	0,5
Giberallik Asit	10 ppm
Max. EC	15(dS/m)
ph	9,5-11,5



UYGULAMA

Sebzeler: (Domates, salatalık, biber, patlıcan vb.) Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır. Yapraktan 150-250 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Pamuk, mısır, soya, yer fıstığı, çetlik, ayçiçeği, tütün vb.: Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama. Yapraktan 150-250 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Patates, şeker pancarı: Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır. Yapraktan 200-300 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Kavun, karpuz, çilek: Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama. Yapraktan 200-300 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Narenciye: Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama. Yapraktan 150-250 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Hububat: Kardeşlenme ve başak döneminden sonra. Yapraktan 200-300 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Üzüm, zeytin: Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında. Yapraktan 150-300 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Elma, armut, şeftali, kiraz, vişne vb.: Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde. Yapraktan 200-300 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

Süs bitkileri, çetlik: Her 15-20 günde bir uygulama. Yapraktan 200-300 cc/100 lt su. Toprakdan 0,5-1 lt/da.

** Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

UYARILAR

Çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz. Serinde uygulayınız. Gübrenin kullanımı esnasında maske, eldiven ve gözlük takınız. Yutmayınız. Teneffüs etmeyiniz. Göz, yüz ve deri ile temastan kaçınınız. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Kullanılmış olan boş ambalajları başka amaçla kullanmayınız. Kullandıktan sonra ambalajları imha ediniz. Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Gübre Kullanımı toprak analizi ve uzman tavsiyesine göre yapılmalıdır. Kullanım dozajları ortalama değerlerdir.


NEON

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

NEON

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	45
Organik Karbon	20
Organik Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3
Serbest Aminoasitler	11
Ph Aralığı	3-5



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık- Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.




MIXTAKE

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

MIXTAKE

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	45
Organik Karbon	20
Toplam Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Ph Aralığı	3-5



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.




TIERRA

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

TIERRA

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	40
Organik Karbon	20
Organik Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Serbest Aminoasitler	3,6
Ph Aralığı	3-5



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.




FULL X ROUTE

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

FULL X ROUTE

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	45
Organik Karbon	20
Toplam Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5,5
Ph	4-6



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜNLER	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler: Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Salatalık, Çilek vb.	250-350 cc/da	2-3 lt/da
Yaprağı yenen kışlık sebzeler: Marul, Ispanak, Pırasa vb.	250-350 cc/da	1-2 lt/da
Bağ	250-350 cc /100 lt su	1-2 lt/da
Kesme çiçekçilikte, Gül, vb.	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Muz	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Tüm Endüstri Bitkileri: Pamuk, Ayçiçeği, Şekerpancarı vb.	250-350 cc /da	2-3 lt/da
Narenciye, Zeytin	250-350 cc /100 lt su	1-2 lt/da
Elma, Kiraz, Şeftali, Armut vb. Meyve Ağaçları	250-350 cc /100 lt su	1-2 lt/da
Karpuz, Kavun, Patates, Soğan, Havuç	250-350 cc /da	1-2 lt/da

Yukarıda belirtilen bitkilerde fide dikimle birlikte kullanıma başlanır. Gelişme dönemi boyunca 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.




ACTIVE FULLMIX 45

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

ACTIVE FULLMIX 45

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	45
Organik Karbon	20
Toplam Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Ph	4-6



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

ÜRÜNLER	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler: Domates, Biber, Salatalık, Patlıcan, Salatalık, Çilek vb.	250-350 cc/da	2-3 lt/da
Yaprağı yenen kışlık sebzeler: Marul, Ispanak, Pırasa vb.	250-350 cc/da	1-2 lt/da
Bağ	250-350 cc /100 lt su	1-2 lt/da
Kesme çiçekçilikte, Gül, vb.	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Muz	250-350 cc /da	1-2 lt/da
Tüm Endüstri Bitkileri: Pamuk, Ayçiçeği, Şekerpancarı vb.	250-350 cc /da	2-3 lt/da
Narenciye, Zeytin	250-350 cc /100 lt su	1-2 lt/da
Elma, Kiraz, Şeftali, Armut vb. Meyve Ağaçları	250-350 cc /100 lt su	1-2 lt/da
Karpuz, Kavun, Patates, Soğan, Havuç	250-350 cc /da	1-2 lt/da

Yukarıda belirtilen bitkilerde fide dikimle birlikte kullanıma başlanır. Gelişme dönemi boyunca 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.


SPOT 25

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

SPOT 25

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	25
Organik Karbon	10
Toplam Azot (N)	1
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	1
Ph Aralığı	4-6



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.




ACTIVE AMINO 11

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

ACTIVE AMINO 11

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	45
Organik Karbon	20
Organik Azot (N)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	3,5
Serbest Aminoasitler	11
Ph	3-5



KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates - Salatalık - Biber - Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfistiği, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300	1-3
Kavuş- Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.


ACTIVE AMİNO 5

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT İÇEREN
SIVI ORGANİK GÜBRE

ACTIVE AMİNO 5

ORGANİK ÜRÜNLER
BİTKİSEL MENŞELİ AMİNOASİT
İÇEREN SIVI ORGANİK GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	40
Organik Karbon	20
Organik Azot (N)	2
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	5
Serbest Aminoasitler	3,6
pH	3-5



KULLANIM YERİ, ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates - Salatalık - Biber - Patlıcan)	Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır.	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek oluşumundan önce ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır.	200-300	1-3
Kavun- Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4
Süs Bitkileri	Her 15-20 günde bir uygulama	200-300	2-3

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

Kimyevi Sıvı gübreler


N-PZn 5-15-0+ME (5 Zn)

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

N-PZn 5-15-0+ME (5 Zn)

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	5
Üre Azotu (N)	5
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Çinko (Zn)	5



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI:

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 lt. Suya
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-4 Lt/Da	100-150 cc
Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik vb.	Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Mısır, Ayçiçeği	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak	İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Çilek, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama	2-3 Lt/Da	100-150 cc
Bağ	Meyveler 6-8 mm olduktan sonra 1-2 uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Fındık	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı vs.	Meyve tutumundan sonra 1-2 uygulama yapılır	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Pamuk	Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama	2-3 Lt/Da	150-200 cc
Zeytin, İncir ve Narenciye	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnabahar	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Yeşil alanlar, Kesme Çiçekçilik	Yetiştirme dönemi boyunca uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc
Fasulye, Nohut, Mercimek	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama	1-3 Lt/Da	100-150 cc

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.


LUCA

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

LUCA

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,2



UYGULAMA MİKTARI

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Topraktan (Kg/da)
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-200	2-4
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	4-5
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	3-4
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	4-5

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ACTIVE CAL 15


EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

ACTIVE CAL 15

EC FERTİLİZER
KALSİYUM KLORÜR ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Kalsiyum Oksit (CaO) 15
Suda Çözünür Bor (B) 0,2

%W/W
15
0,2



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 lt. Suya
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-4 Lt / Da.	100-200 cc
Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik vb.	Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	200-300 cc
Mısır , Ayçiçeği	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.	200-300 cc
Şeker Pancarı , Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak	İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Çilek, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.	100-150 cc
Bağ	Meyveler 6-8 mm olduktan sonra 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Fındık	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s	Meyve tutumundan sonra 1-2 uygulama yapılır.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Pamuk	Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.	150 –200 cc
Zeytin, İncir ve Narenciye	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100–150 cc
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnabahar	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100–150 cc
Yeşil alanlar , Kesme Çiçekçilik	Yetiştirme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.	100–150 cc
Fasulye, Nohut, Mercimek	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.	100–150 cc

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ZECCA


EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)

ZECCA

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%W/W
8



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-250	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	3-4
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4

Yukarıda belirtilen bitkilerde gelişme döneminden itibaren 15 gün arayla uygulanır.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

ACTIVE ZINC 8


EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)

ACTIVE ZINC 8

EC FERTİLİZER
ÇİNKOLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ
(ÇİNKO SÜLFAT İÇERİKLİ)

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Çinko (Zn)

%W/W
8



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA	YAPRAKTAN UYGULAMA 100 lt. Suya
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.	100-250 cc
Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik vb.	Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	150-200 cc
Mısır , Ayçiçeği	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-250 cc
Şeker Pancarı , Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak	İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	200-300 cc
Çilek, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.	100-150 cc
Bağ	Meyveler 6-8 mm olduktan sonra 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Fındık	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s	Meyve tutumundan sonra 1-2 uygulama yapılır.	1-3 Lt / Da.	100-150 cc
Pamuk	Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.	150 –200 cc
Zeytin, İncir ve Narenciye	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	150–200 cc
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnabahar	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.	100–150 cc
Yeşil alanlar , Kesme Çiçekçilik	Yetiştirme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.	100-200 cc
Fasulye, Nohut, Mercimek	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.	100–150 cc

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

BOR-X


EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN

BOR-X

EC FERTİLİZER
BORON ETANOL AMİN

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Bor (B)

%W/W
8



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su ile)	Damla Sulamadan cc/1 da
AÇIK TARLA VE SERA SEBZELERİ	1. UYGULAMA Fide dikiminden sonra 2. UYGULAMA İlk uygulamadan 15 gün sonra	100-150	300-500
MEYVELER (ELMA, ARMUT, KİRAZ, KAYISI, ERİK, ŞEFTALİ, BADEM, FINDIK, CEVİZ, ZEYTİN)	1. UYGULAMA Çiçeklenmeden önce 2. UYGULAMA Hasattan sonra	100-200	400-500
PAMUK	Koza oluşumundan önce	100-150	300-400
ÇİLEK	1. UYGULAMA Çiçeklenmeden önce 2. UYGULAMA İlk uygulamadan 15 gün sonra	100-150	300-500
TURUNÇGİLLER MUZ, ZEYTİN	Hasattan sonra çiçeklenmeden önce Doğum döneminde çiçeklenmeden önce	100-200	400-500
BAĞ, KİVİ	1. UYGULAMA Göz kabarmasında 2. UYGULAMA Çiçeklenmeden önce	100-200	300-500
TARLA BİTKİLERİ (BUĞDAY, ARPA, ÇELTİK)	Kardeşlenme dönemi ve sapa kalkma dönemi arasında tek uygulama	100-150	-
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ (Ş.PANCARI, MISIR, AYÇİÇEK, PATATES)	1. UYGULAMA Ekim öncesi topraktan 2. UYGULAMA Bitki boyunun 15-20 cm olduğu dönemde	100-150	300-500
BAKLAGİLLER (FASULYE, NOHUT, MERCİMEK)	Gelişme dönemi boyunca	100-150	300-400

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.


HYDRA DİJİTAL 7.7.7

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

HYDRA DİJİTAL 7.7.7

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	7
Üre Azotu (NH ₂ -N)	7
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	7
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	7



UYGULAMA MİKTARI

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su ile)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber- Salatalık- Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-200	2-4
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	4-5
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	3-4
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	4-5

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.


Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

HYDRA PHOS 7-21-0+ME

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	7
Amonyum Azotu (N-NH ₄)	1,8
Üre Azotu (N-NH ₂)	5,2
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	21
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,5



UYGULAMA MİKTARI

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber- Salatalık- Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-300	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çeltik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz, Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	3-4
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

HYDRA PHOS 7-21-0+ME

EC FERTİLİZER NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ



HYDRA K 25


POTASYUM ÇÖZELTİSİ

HYDRA K 25

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

%W/W
25



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik vb.	Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Mısır , Ayçiçeği	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.
Şeker Pancarı , Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak	İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Çilek, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Bağ	Meyveler 6-8 mm olduktan sonra 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Fındık	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s	Meyve tutumundan sonra 1-2 uygulama yapılır.	1-3 Lt / Da.
Pamuk	Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Zeytin, İncir ve Narenciye	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnabahar	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Yeşil alanlar , Kesme Çiçekçilik	Yetiştirme dönemi boyunca uygulama.	2-3 Lt / Da.
Fasulye, Nohut, Mercimek	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

ACTIVE K 25


POTASYUM ÇÖZELTİSİ

ACTIVE K 25

POTASYUM ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K_2O)

%W/W
25



KULLANIM ALANI, ŞEKLİ, ZAMANI VE MİKTARI

KULLANIM ALANI	KULLANIM ZAMANI	DAMLAMA SULAMA İLE UYGULAMA
Tüm Sera ve Örtü Altı Sebzeleri	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Çeltik vb.	Gelişim periyodu boyunca 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Mısır , Ayçiçeği	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.
Şeker Pancarı , Patates, Soğan, Turp, Havuç, Sarımsak	İlk çapadan, olgunlaşma başlangıcına kadar 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Çilek, Kivi	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Bağ	Meyveler 6-8 mm olduktan sonra 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Fındık	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Kayısı, Badem, Ceviz, Şeftali, Antep Fıstığı v.s	Meyve tutumundan sonra 1-2 uygulama yapılır.	1-3 Lt / Da.
Pamuk	Koza tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Zeytin, İncir ve Narenciye	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	1-3 Lt / Da.
Kavun, Karpuz, Kabak ve Karnabahar	Meyve tutumundan itibaren 1-2 uygulama.	2-3 Lt / Da.
Yeşil alanlar , Kesme Çiçekçilik	Yetiştirme dönemi boyunca uygulama.	2-3 Lt / Da.
Fasulye, Nohut, Mercimek	Vejetatif gelişme dönemi boyunca uygulama.	1-3 Lt / Da.

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.

Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.


RİO 8.8.8

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

RİO 8.8.8

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	8
Üre Azotu (N-NH ₂)	8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	8
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	8



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-200	2-4
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	4-5
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	4-5

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.


RİO 3.15.0+ME

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

RİO 3.15.0+ME

EC FERTİLİZER
NP GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	3
Amonyum Azotu (NH ₄ -N)	1,2
Üre Azotu ((NH ₂ -N))	1,8
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,2
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,5



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-200	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	3-4
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	3-4
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	3-4

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.


RİO 3.0.20

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

RİO 3.0.20

EC FERTİLİZER
NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	3
Üre Azotu (N-NH ₂)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	20



KULLANIM YERİ ZAMANI VE DOZU

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-200	2-3
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	4-5
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	3-4
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	4-5

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.


RİO 16

EC FERTİLİZER
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

RİO 16

EC FERTİLİZER
AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	16
Üre Azotu (NH ₂ -N)	16



UYGULAMA MİKTARI

Ürün	Uygulama Zamanı	Yapraktan (cc/100 L su)	Damla Sulamadan Kg/da
Sebzeler (Domates-Biber-Salatalık-Patlıcan)	Ekimle birlikte çiçekten sonra, hasada kadar	100-200	2-4
Pamuk, Mısır, Soya, Yerfıstığı, Çetlik, Ayçiçeği, Tütün	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	4-5
Patates, Şekerpancarı	Yumruların oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır	200-300	1-3
Kavun, Karpuz Çilek	Çiçek devresinde ve meyve olgunlaşma dönemi boyunca 4-5 uygulama	200-300	1-3
Narenciye	Çiçek devresinden sonra 20 gün ara ile 3-4 uygulama	200-300	4-5
Hububat	Kardeşlenme ve başak döneminden sonra	200-300	4-5
Üzüm, Zeytin	Çiçeklenme öncesi ve meyve büyütme sırasında	150-300	2-3
Elma, Armut, Kiraz, Vişne, Şeftali vb.	Pembe tomurcuk döneminde çiçeklenme sonrası ve hasat döneminde	200-300	4-5

Uygulama Şekli ve Dozları


Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

Salt-EX

PH REGÜLATÖRÜ
TUZLULUK GIDERİCİ



KULLANIM DOZU ve DÖNEMLERİ

KULLANIM

Topraktan Uygulamalarda dönüme (1000 m²) 2 - 3 Lt'dir.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.
- Tahriş edicidir. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları imha ediniz.
- Uygulama esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.

Salt-EX

PH REGÜLATÖRÜ
TUZLULUK GIDERİCİ




CARBOXLY

PH REGÜLATÖRÜ
TUZLULUK GIDERİCİ

CARBOXLY

PH REGÜLATÖRÜ
TUZLULUK GIDERİCİ



KULLANIM DOZU ve DÖNEMLERİ

KULLANIM

Topraktan Uygulamalarda dönüme (1000 m²) 2 - 3 Lt'dir.

UYARILAR

- Dikkat çocuklardan ve gıdalardan uzak tutunuz.
- Asla uygun doz oranlarını aşmayınız ve sadece gerekli olan yerlerde kullanınız.
- Kullanmadan önce mutlaka çalkalayınız.
- Tahriş edicidir. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz. Göz ve elle temasında bol su ile yıkayınız.
- Kullanımdan sonra ellerinizi bol su ile yıkayınız ve kullanılmış olan boş ambalajları imha ediniz.
- Uygulama esnasında maske, eldiven ve gözlük kullanınız.

ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Suda, tavsiye edilen konsantrasyonlarda çözünür ve hiçbir şekilde çökmez ve kalıntı bırakmaz.



Klasik Gübreler



ALP ATEŞ ÜRE

EC FERTILIZER
% 46 N ÜRE

ALP ATEŞ ÜRE

EC FERTILIZER
% 46 N ÜRE



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

DAP
18.46.0

EC FERTİLİZER
DİAMONYUM FOSFAT

ALP ATEŞ DAP 18.46.0

EC FERTİLİZER
DİAMONYUM FOSFAT



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

AMONYUM SÜLFAT

EC FERTILIZER
N 21

AMONYUM SÜLFAT

EC FERTILIZER
% 21 N



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



50Kg

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

15-15-15+(5 SO₃)

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ

15-15-15+(5 SO₃)

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ


Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	15
Amonyum Azotu (N)	4,8
Üre Azotu (N)	10,2
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	8,5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	7,8
Sadece Mineral Asitte	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	6,5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	15
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

15-15-15+(7 SO₃)+ME

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ

15-15-15+(7 SO₃)+ME

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	15
Amonyum Azotu (N)	4,7
Üre Azotu (N)	10,3
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	9,7
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	9
Sadece Mineral Asitte	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	5,3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	15
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Toplam Çinko (Zn)	1



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

20-20-0+(5 SO₃)

EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ

20-20-0+(5 SO₃)

EC FERTİLİZER
NP GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N)	5,5
Üre Azotu (N)	14,5
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	10,3
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	9,5
Sadece Mineral Asitte Çözünür	
Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	9,7
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

20-20-0+(7 SO₃)+ ME

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

20-20-0+(7 SO₃)+ME

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N)	5,5
Üre Azotu (N)	14,5
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	11
Sadece Mineral Asitte	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	8
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Toplam Çinko (Zn)	1



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

20-32-0+(5SO₃)+ME

EC FERTİLİZER NP GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N)	11
Üre Azotu (N)	9
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	28
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	26
Sadece Mineral Asitte	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	4
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	5
Toplam Çinko (Zn)	0,5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



20-32-0+(5SO₃)+ME

EC FERTİLİZER NP GÜBRESİ



URAS AZOT N 33

EC FERTILIZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

URAS AZOT N 33

EC FERTILIZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	33
Amonyum Azotu (N)	9
Üre Azotu (N)	24
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO ₃)	25



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ACTIVE NİTRO PLUS N33

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

ACTIVE NİTRO PLUS N 33

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	33
Amonyum Azotu (N)	9
Üre Azotu (N)	24
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO ₃)	25



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ULTRA POWER

13-24-12+(10 SO₃)+ME

BOR KATKILI
EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ

ULTRA POWER

13-24-12+(10 SO₃)+ME

BOR KATKILI EC FERTİLİZER NPK GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	13
Amonyum Azotu (N)	9,5
Üre Azotu (N)	3,5
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	19
Sadece Mineral Asitte Çözünür	
Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	4
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	12
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Toplam Bor (B)	0,1
Toplam Çinko (Zn)	0,5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.



ULTRA POWER

13-24-12+(10 SO₃)+ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ

ULTRA POWER

13-24-12+(10 SO₃)+ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	13
Amonyum Azotu (N)	9
Üre Azotu (N)	4
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	19
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	18
Sadece Mineral Asitte Çözünür	
Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	5
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	12
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Toplam Çinko (Zn)	0,5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.


Hammadeler

HAMMADELER

MAP
MKP
ÜRE FOSFAT
POTASYUM SÜLFAT
POTASYUM KlorÜR
POTASYUM NİTRAT
KALSİYUM NİTRAT
MAGNEYUM NİTRAT
MAGNEYUM SÜLFAT
MAGNEYUM SÜLFAT ANHİDRAT
EDDHA % 6



Ambalaj Tipi



1000 kg

NPK Gübre Serisi



ARES NPK

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SERİSİ (HARMANLANMIŞ)

ARES NPK

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SERİSİ

FORMULASYONLAR

16-8-24+ME
18-18-18+ME
15-30-15+ME
15-5-30+ME
20-10-20+ME
20-20-20+ME
7-7-40+ME
0-5-55+ME



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

BEST DRIP NPK

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SERİSİ (HARMANLANMIŞ)

BEST DRIP NPK

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SERİSİ

FORMULASYONLAR

16-8-24+ME
18-18-18+ME
15-30-15+ME
20-10-20+ME
10-0-40
25-5-0



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ZEPLİN NPK

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SERİSİ (HARMANLANMIŞ)

ZEPLİN NPK

EC FERTILIZER
NPK GÜBRE SERİSİ

FORMULASYONLAR

16-8-24+ME
18-18-18+ME
15-30-15+ME
15-5-30+ME
20-10-20+ME
20-20-20+ME
7-7-40+ME
0-40-40+ME
0-5-55+ME
ZEPLİN UP 18-44-0



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

APEX NPK

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE SERİSİ (HARMANLANMIŞ)

APEX NPK

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE SERİSİ

FORMULASYONLAR

16-8-24+(2MgO)ME
18-18-18+ME
15-30-15+ME
20-20-20+ME



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



25Kg

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

AGROKİNG NPK

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE SERİSİ (HARMANLANMIŞ)

AGROKİNG NPK

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE SERİSİ

FORMULASYONLAR

16-8-24+ME
18-18-18+ME
15-30-15+ME
15-5-30+ME
11-5-43+ME
15-40-0+ME
20-10-20+ME
20-20-20+ME
7-7-40+ME
0-5-55
13-0-44

UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.



Ambalaj Tipi



JOKER NPK

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE SERİSİ (HARMANLANMIŞ)

JOKER NPK

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRE SERİSİ

FORMULASYONLAR

16-8-24+ME
18-18-18+ME
15-30-15+ME
20-10-20+ME
20-20-20+ME
6-6-46+ME
13-0-44



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

Yavaş Salınımlı Gübreler

JUNIO BLUE

12-12-17+(2MgO)+(15 SO₃)+ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ

JUNIO BLUE

12-12-17+(2MgO)+(15 SO₃)+ME

EC FERTILIZER
NPK GÜBRESİ NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	12
Amonyum Azotu (N)	7
Üre Azotu (N)	5
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)	0,39
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	12
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	11
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	17
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	2
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	15
Suda Çözünür Bor (B)	0,01
Suda Çözünür Çinko (Zn)	0,5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

Ambalaj Tipi



RAINBOW

13-16-8+(2MgO)+(15 S03)+ME

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ

RAINBOW

13-16-8+(2MgO)+(15 S03)+ME

EC FERTİLİZER
NPK GÜBRESİ NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	13
Amonyum Azotu (N)	6
Üre Azotu (N)	7
Nitrifikasyon İnhibitörü (DCD)	0,39
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	16
Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit (P ₂ O ₅)	14
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	8
Suda Çözünür Magnezyum Oksit (MgO)	2
Toplam Kükürt Trioksit (S0 ₃)	15
Suda Çözünür Demir (Fe)	4



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

Ambalaj Tipi



25Kg

ZEPLİN GREEN 21

AMONYUM SÜLFAT
NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ

Garanti Edilen İçerik
Amonyum Azotu (N)
Disiyandiamid (DCD)

%W/W
21
0,54



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



ZEPLİN GREEN 21

AMONYUM SÜLFAT
NİTRİFİKASYON İNHİBİTÖRLÜ

Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ZEPLİN YELLOW 46

EC FERTİLİZER
(NBPT İNHİBİTÖRLÜ ÜRE AZOTU)

ZEPLİN YELLOW 46

EC FERTİLİZER
(NBPT inhibitörlü Üre Azotu)

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Üre Azotu (N)	46
N-(NBUTYL) Tiyofoforiktriamide (NBPT)	0,06



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.



Azot içerikli gübreler

ACTIVE NİTRO PLUS

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

ACTIVE NİTRO PLUS

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	33
Amonyum Azotu (N)	9
Üre Azotu (N)	24
Suda Çözünür Kükürttri Oksit (SO ₃)	25



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

URAS AZOT N 33

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

URAS AZOT N 33

EC FERTİLİZER
ÜRE AMONYUM SÜLFAT

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	33
Amonyum Azotu (N)	9
Üre Azotu (N)	24
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	25



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.



Organomineral Gübreler

BAŞAK 8-20-0+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

BAŞAK 8-20-0+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	8
Amonyum Azotu (N)	4,8
Üre Azotu (N)	3,2
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	20
Sadece Mineral Asitlerde	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	10,4
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	9,6
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam (humik+fulvik) Asit	7
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	0,5
Ph	6-8



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

JOKER 8-20-0+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

JOKER 8-20-0+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	8
Amonyum Azotu (N)	4,8
Üre Azotu (N)	3,2
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	20
Sadece Mineral Asitlerde	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	10,4
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	9,6
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam (humik+fulvik) Asit	7
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	0,5
Ph	6-8



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

POWER20-20-0

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

POWER 20-20-0

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	20
Amonyum Azotu (N)	8
Üre Azotu (N)	12
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	20
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	18,5
Toplam (humik+fulvik) Asit	7
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	0,5
Ph	6-8



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ULTRA BAŞAK 12-22-0+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

ULTRA BAŞAK 12-22-0+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NP'Lİ KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE


Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	12
Amonyum Azotu (N)	7,5
Üre Azotu (N)	4,5
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	22
Sadece Mineral Asitlerde	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	6,5
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	15,5
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam (humik+fulvik) Asit	7
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	0,5
Ph	6-8



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ULTRA DENG

11-11-11+(10 SO₃)+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

ULTRA DENG

11-11-11+(10 SO₃)+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	11
Amonyum Azotu (N)	5
Üre Azotu (N)	6
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	11
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	8
Sadece Mineral Asitlerde	
Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	3
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	11
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	10
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam (humik+fulvik) Asit	7
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	9
Ph	5,5-7,5



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

ALP-NİTRO N24

AZOTLU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

ALP-NİTRO N24

AZOTLU KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	20
Toplam Azot (N)	24
Amonyum Azotu (N)	2,5
Üre Azotu (N)	21,5
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO ₃)	7
Toplam (humik+fulvik) Asit	10
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	0,5
Ph	5-7



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve ziraî uzmana danışınız.

ULTRA TUBER 12-15-10+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

ULTRA TUBER 12-15-10+ME

ORGANOMİNERAL ÜRÜNLER
NPK'LI KATI ORGANOMİNERAL GÜBRE

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Organik Madde	15
Toplam Azot (N)	12
Amonyum Azotu (N)	7
Üre Azotu (N)	5
Toplam Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	15
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	13
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K ₂ O)	10
Toplam Çinko (Zn)	0,1
Toplam (humik+fulvik) Asit	7
Max. Nem	20
Max Klor (Cl)	8,5
Ph	6-8



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	80-100 Kg/da
Soğan	50-60 Kg/da
Elma (yaşına göre)	1-3 Kg/ağaç
Narenciye (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Zeytin (yaşına göre)	1-4 Kg/ağaç
Açık tarla sebzeleri	50-60 Kg/da
Karpuz	50-60 Kg/da
Havuç, Turp	40-50 Kg/da
Pamuk	40-50 Kg/da
Mısır	50-60 Kg/da
Şeker pancarı	60-70 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	30-40 Kg/da
Buğday, Arpa	30-40 Kg/da
Üzüm	50-70 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları

Yağmurlama, mini sprink gibi her türlü sulama sisteminde kullanılabilir. Kullanılacak miktar; iklim, toprak cinsi, hava ısısı, ürün cinsi, verim durumu ve sulama sistemi farklılığı gibi nedenlerle değişiklik gösterebilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.

Micro Granül Gübreler



MGT
MICRO GRANULE
TECHNOLOGY

GOLD STARTER

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

11-47-0 + (2MgO)+(6SO₃)+ME

GOLD STARTER

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

11-47-0 + (2MgO)+(6SO₃)+ME

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	11
Amonyum Azotu (N)	11
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	47
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	42
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	2
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	6
Toplam Çinko (Zn)	1



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	2-4 Kg/da
Soğan	2-4 Kg/da
Elma (yaşına göre)	4-6 Kg/da
Narenciye (yaşına göre)	4-6 Kg/da
Zeytin (yaşına göre)	4-6 Kg/da
Açık tarla sebzeleri	2-4 Kg/da
Karpuz	2-4 Kg/da
Havuç, Turp	2-4 Kg/da
Pamuk	2-4 Kg/da
Mısır	2-4 Kg/da
Şeker pancarı	2-4 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	2-4 Kg/da
Buğday, Arpa	2-4 Kg/da
Üzüm	4-6 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları: GOLD STARTER, tohum ekimi, fide ve fidan dikimi esnasında toprağa uygulanan mikro granül taban gübresidir. Tohum ekimi sırasında, özel ekipmanlar eklenmiş aletler ile uygulanması tavsiye edilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir. Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zırai uzmana danışınız.



MİKRO GRANÜL GÜBRELER

MGT

MICRO GRANULE
TECHNOLOGY

APEX STARTER

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

11-47-0 + (2MgO)+(6SO₃)+ME

APEX STARTER

EC FERTILIZER
NP GÜBRESİ

11-47-0 + (2MgO)+(6SO₃)+ME

Garanti Edilen İçerik	%W/W
Toplam Azot (N)	11
Amonyum Azotu (N)	11
Nötral Amonyum Sitrat ve	
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	47
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P ₂ O ₅)	42
Toplam Magnezyum Oksit (MgO)	2
Toplam Kükürt Trioksit (SO ₃)	6
Toplam Çinko (Zn)	1



UYGULAMA MİKTARI

BİTKİ DESENİ	TOPRAKTAN
Patates	2-4 Kg/da
Soğan	2-4 Kg/da
Elma (yaşına göre)	4-6 Kg/da
Narenciye (yaşına göre)	4-6 Kg/da
Zeytin (yaşına göre)	4-6 Kg/da
Açık tarla sebzeleri	2-4 Kg/da
Karpuz	2-4 Kg/da
Havuç, Turp	2-4 Kg/da
Pamuk	2-4 Kg/da
Mısır	2-4 Kg/da
Şeker pancarı	2-4 Kg/da
Ayçiçeği, Yer fıstığı	2-4 Kg/da
Buğday, Arpa	2-4 Kg/da
Üzüm	4-6 Kg/da

Ambalaj Tipi



Uygulama Şekli ve Dozları: APEX STARTER, tohum ekimi, fide ve fidan dikimi esnasında toprağa uygulanan mikro granül taban gübresidir. Tohum ekimi sırasında, özel ekipmanlar eklenmiş aletler ile uygulanması tavsiye edilir.

Uyarılar

Toprak ve / veya yaprak analizi yaptırarak gübre kullanılması tavsiye edilir.
Uygun doz oranı için mutlaka toprak ve bitki analizi yaptırınız ve zirai uzmana danışınız.



MİKRO GRANÜL GÜBRELER

Notlar



Notlar





ALP-ATEŞ GÜBRE A.Ş

ALP-ATEŞ GÜBRE A.Ş.
GÜZELÇAY MAH. PRF. MUAMMER AKSOY CAD. NO: 39
İSKENDERUN/ HATAY
444 8 675
INFO@ALPATES.COM.TR

